

決定結核病接觸者檢查優先順序參考事項

一、 影響結核病個案傳播因素

因子	高傳播	低傳播
1. 結核病部位	咽喉/肺	單純肺外
2. 痰塗片狀態	陽性	陰性
3. 胸部 X 光片	開洞	未開洞
4. 症狀/行為	咳嗽、唱歌、打噴嚏、善長社交活動、接受引發咳嗽的醫療處置(如: 支氣管鏡...)	無咳嗽、唱歌、打噴嚏
5. 年齡	成人或青少年	小於 10 歲的小孩
6. 結核病用藥	尚未開始服藥或者非有效處方	已開始服藥達兩週以上

二、 結核病接觸者發病危險因子

接觸者越年幼越容易因感染而發病，其餘影響接觸者發病危險因子如下表：

第一類：免疫相關 (該類接觸者 TST 陽性判定標準為 5mm)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> HIV 感染
<input type="checkbox"/> 接受癌症化療藥物
<input type="checkbox"/> 服用類固醇 (每日劑量大於 15mg 且服用超過 4 週【或依體重換算劑量 > 2mg/kg】)
<input type="checkbox"/> 使用腫瘤壞死因子拮抗劑 TNF- α blocker (恩博 Enbrel [®] , 復邁 Humira [®] , 欣普尼 Simponi [®] , 恩瑞舒 Orencia [®] , 類克 Remicade [®] , 安挺樂 Actemra [®] , 捷抑炎 Xeljanz [®])
<input type="checkbox"/> 器官移植使用抗排斥藥物 | <input type="checkbox"/> 自體免疫疾病： <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 紅斑性狼瘡(Systemic Lupus Erythematosus) <input type="radio"/> 全身性硬化症(Systemic Sclerosis) <input type="radio"/> 類風濕關節炎(Rheumatoid Arthritis) <input type="radio"/> 多發性肌炎(Polymyositis) <input type="radio"/> 皮肌炎(Dermatomyositis) <input type="radio"/> 血管炎(Vasculitis) <input type="radio"/> 貝賽特氏病(Behcet' s Disease) <input type="radio"/> 天孢瘡(Pemphigus) <input type="radio"/> 乾燥症(Sjogren' s Syndrome) <input type="radio"/> 克隆氏症(Crohn' s Disease) <input type="radio"/> 慢性潰瘍性結腸炎(Ulcerative Colitis) <input type="radio"/> 其他_____ |
|---|---|

第二類：若能控制或戒除，即能降低結核發病風險的因子

- 糖尿病： 未檢查 (建議前往醫療院所檢查血糖) 治療中 (規則治療 不規則治療)
- 吸菸 (一生中吸菸支數超過 100 支並且目前仍然在吸菸)
- 喝酒 (過去 3 個月平均每週喝酒 1 次或 1 次以上)

第三類：其他醫療狀況

- 慢性肺阻塞疾病 矽肺病 血液/腹膜透析(洗腎)/慢性腎衰竭
- 胃切除手術術後/空腸迴腸改道術