

共病族群潛伏結核感染檢驗與治療訊息單張

潛伏結核感染(LTBI)是指體內有沉睡的結核菌，但還沒有發病成為結核病人的狀態，未發病前不具傳染力也沒有任何症狀，但日後可能因年紀大、慢性疾病等造成免疫力不好而發病。不過只要經過完整治療，超過 90%以上的人體內沉睡的結核菌可被殺死，避免日後發病。

依據世界衛生組織(WHO)公布的潛伏結核感染治療指引，共病族群之結核菌感染及發病風險較高，列為建議優先執行LTBI 檢驗及治療之對象。而我國研究顯示，慢性阻塞性肺病(COPD)患者之結核病發病風險約為一般民眾4倍、糖尿病(DM)血糖控制不佳者之結核病發病風險約為沒有糖尿病者的3倍、腎臟病第3期到第5期(含長期洗腎、腎臟移植)者之結核病發病風險約為非腎臟病者的2-20倍。為保障您免於結核病發病之威脅，歡迎您踴躍參加，潛伏結核感染公費檢驗與治療活動，保護自身健康。

要知道自己是否有潛伏結核感染，可進行丙型干擾素釋放試驗(interferon-gamma release assay, IGRA)，只需抽 4~5c.c.的血，大約1~2週後可以知道檢驗結果。如果檢驗結果為陽性，表示您曾經感染過結核菌，您需回診接受胸部X光檢查，確定目前沒有結核病發病，經醫師評估後，由衛生局及合作醫院提供公費的預防性治療藥物並減免就醫部分負擔，以及關懷員提供目視服藥的都治服務。

部分服藥者在服藥期間可能會出現發燒、出疹子、頭暈、頭痛、噁心或嘔吐、肌肉痠痛、疲勞等症狀，通常不會影響日常生活，只要多喝水多休息，服藥後數小時即可改善，如有出現發燒情形，在服用退燒藥後亦可緩解，僅有極少數會出現肝炎等副作用。不過請您別擔心，參加計畫者有都治計畫關懷員協助您觀察副作用，如您有不舒服情形，可向關懷員或衛生局或醫療院所指定之個案管理師反映，請其協助您或轉請診療醫師處理。

潛伏結核感染檢驗自費市價約3,000元，預防性治療依處方不同，藥費最高價值約7,000元，現在公費提供讓符合條件的民眾有機會接受檢驗與治療，提醒您檢驗陽性者需接受治療，才能有效降低未來結核病發病風險，如您想瞭解自身感染情形，且檢驗陽性也願意接受治療，請填妥下列報名資料。

請民眾填寫參加潛伏結核感染檢驗與治療報名表

姓名：_____ 身分證號：_____

連絡電話：_____ 居住地址：_____

簽署日期：_____ 簽名_____

請診療醫師填寫以下醫囑資訊

開立潛伏結核感染檢驗，日期：_____。

開立潛伏結核感染治療，日期：_____。

**本項LTBI檢驗及治療資訊，連同民眾簽署之報名表，請轉知院內指定管理人員至TB系統進行建檔、開案或資料維護。

