

藥物單元 流感抗病毒藥劑

流感藥帖 知多少 | 認識流感抗病毒藥劑

神經胺酸酶抑制劑

商品名	克流感® (Tamiflu®)	瑞樂沙™ (Relenza™)
廠商	羅氏大藥廠	荷商葛蘭素史克藥廠
主成分	Oseltamivir	Zanamivir
包裝	75毫克膠囊10入之盒裝, 膠囊體印有"ROCHE"及"75 mg"印記	盒裝有碟型吸入器1枚, 及含4孔規則間隔之泡囊5入
給藥方式	經口投藥	經口吸入
治療性用藥標準劑量*	每天2次, 每次吞服一顆, 為期5天, 故一盒為一次治療劑量	每天2次, 每次吸2孔, 為期5天, 故一盒為一次治療劑量
預防性用藥標準劑量*	每天1次, 持續服用10天	
療效	症狀開始後48小時內投藥療效最佳; 可減輕症狀嚴重度、縮短病程(平均縮短1-2天), 減少病毒擴散及降低發生併發症之風險	
適用年齡	克流感® 有多種劑型; 目前在國內上市為克流感® 膠囊75mg, 適用於13歲(含)以上之青少年與成人, 或兒童的體重超過40公斤以上, 且能吞服膠囊者	5歲(含)以上之青少年與成人
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 常見副作用為短暫的輕微噁心及嘔吐, 飯後服用通常可減輕症狀 日本曾有出現神經精神方面事件的案例(行為及感覺異常、幻覺、嗜睡或意識障礙等), 多發生於未成年病患, 故於用藥時應注意上述異常行為之發生 孕婦、授乳婦女除非服藥益處大於對胎兒及嬰兒的危險, 否則應避免使用 對Oseltamivir phosphate或其任何成分會產生過敏者, 禁止使用 	<ol style="list-style-type: none"> 曾有在使用後出現支氣管痙攣或呼吸功能降低之報告, 但極為罕見 瑞樂沙™ 係使用碟型吸入器, 以經口吸入方式將藥物投入呼吸道, 使用上較需技巧性 如患者有使用其他吸入劑型之藥物, 應於使用瑞樂沙前吸入 孕婦、授乳婦女除非服藥益處大於對胎兒及嬰兒的危險, 否則應避免使用 對Zanamivir或其任何成分會產生過敏者, 禁止使用

*按季節性流感之使用劑量。



行政院衛生署疾病管制局全球資訊網

<http://www.cdc.gov.tw>

行政院衛生署藥物資訊網

<http://drug.doh.gov.tw>

行政院衛生署疾病管制局

疫情通報及諮詢專線: 1922