

台灣流感速訊

Taiwan Influenza Express

發行：衛生署疾病管制局國家流感中心 | 2007~2008 流感流行季 | 出刊：2007年第52週 (12/23至12/29)

台灣類流感疫情：

- 96年第52週(96/12/23-12/29)診所定醫通報類流感病例比率整體疫情較前3週平均值增加4.2%，較去年同期低，低於該週期望值，近4週(96年第49-52週)類流感病例比率(%)為：3.63、3.76、3.93、3.93(見附圖一)；與前3週平均值比較，除東區下降外，餘五區則皆呈上升。
- 實驗室監測之採檢定醫檢體，近6週流感病毒分離以檢出A/H1型最多，其次為A/H3，(見附圖二)而其他呼吸道病毒則以檢出Adenovirus及HSV(Herpes simplex virus)為主。


總結：台灣地區流感監測顯示類流感比率較前3週平均值增加，流感病毒分離以檢出A/H1型為最多。

世界主要地區流感疫情：


- 亞洲地區：**香港第51週(12/16-12/22)定醫(私人醫師)通報之流感求診率為51.4%，較前週上升，高於去年同期，自2007年1月迄今，流行株以甲型H3N2為主。日本第50週(12/10-12/16)定醫通報類流感病例(5.67)，高於上週，高於去年同期，自37週起流行株以A(H1)流感病毒為主。
- 美加地區：**美國第51週(12/16-12/22)類流感持續上升，肺炎與流感之死亡率低於警戒值，類流感(ILI)就診率與全國平均基準值相同，而急性呼吸道疾病(ARI)就診率低於全國平均基準值，目前3州有區域性流行、6州有地區性流行、32州通報散發性(sporadic)流行。加拿大第51週(12/16-12/22)為低度流感流行，2個地區通報地區性及15個地區通報散發性流行事件；定醫通報類流感求診率為23%，與上週相似(整體定醫回報率44%)，在期望值之內。流行季迄今以A型流感病毒(佔83%)為主，B型流感(佔17%)次之。
- 歐洲地區：**EISS指出第51週(12/17-12/23)季節性流感通報仍為低水平，18國通報低度流行及1個國家(西班牙)通報中度流行。自40週以來，流感分型以A型佔大多數。
- 全球(以WHO Flu-net資料為主)**全球流感監測網指出：截至2008/01/04 14:30止，第51週有區域性流行(regional outbreak)於日本；地區性流行(local outbreak)於捷克；散發性(Sporadic)於烏克蘭、中國、葡萄牙、斯洛維尼亞、瑞士、拉脫維亞、挪威、義大利和法國。其餘地區為No activity或No report。

總結：流感季節來臨，世界各地陸續出現區域流行或散發性流流通報個案，民眾應小心防範。


WHO FLU-NET 全球各地流感監測圖



圖一.台灣每週診所定點醫師類流感病例比率圖



圖二.實驗室流感病毒分型圖



資料來源

世界各地流感疫情：WHO FLU-NET、美國 CDC、加拿大 PHAC、歐洲 EISS、日本厚生省感染症研究所、香港衛生署
台灣類流感疫情：行政院衛生署疾病管制局 <http://www.cdc.gov.tw> 流感防治網：<http://flu.cdc.gov.tw>

流感速訊是由台灣疾病管制局每週報告有關2007/08流感季節資訊，並總結本地及世界各地流感季節疫情。

防疫視同作戰

團結專精實幹