



# 麻疹小檔案

病原	<ul style="list-style-type: none"><li>• 麻疹病毒</li></ul>
好發季節	<ul style="list-style-type: none"><li>• 好發於冬末及春季</li></ul>
症狀	<ul style="list-style-type: none"><li>• 高燒逾38°C、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔內黏膜有斑點，皮疹會從耳後開始，並擴散到臉部、軀幹和四肢；少數有中耳炎、肺炎與腦炎等併發症。</li></ul>
傳染途徑	<ul style="list-style-type: none"><li>• 空氣、飛沫傳染，或直接接觸病人鼻腔或咽喉分泌物。</li></ul>
潛伏期	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7~18天，通常為14天</li></ul>
可傳染期	<ul style="list-style-type: none"><li>• 發疹前後4天</li></ul>
治療	<ul style="list-style-type: none"><li>• 支持療法及避免併發症發生</li></ul>
預防方法	<ul style="list-style-type: none"><li>• 出生滿12個月、小一各接種1劑MMR混合疫苗(麻疹、腮腺炎、德國麻疹)</li><li>• 未感染且未接種疫苗的嬰兒，避免赴中國、東南亞等高風險地區。</li><li>• 出現疑似症狀應戴口罩就醫，避免上班、上學，搭大眾運輸工具</li></ul>

# 麻疹典型症狀



科氏斑 (Koplik spot)



皮疹 (軀幹)



皮疹 (頭頸部)



結膜炎

★一般是由臉部開始出現紅斑丘疹，由上而下蔓延到頸、上肢、軀幹和下肢，皮疹大多不癢，皮疹有逐漸融合的趨勢，在第三天依出現先後次序開始消退。消退後會留下棕色的色素沉著，維持一段時間，也可能出現脫皮現象。

(照片由黃高彬醫師提供)