

102年

# 2-5歲幼童公費肺炎鏈球菌疫苗接種須知

**疫苗項目**：13價結合型肺炎鏈球菌疫苗  
(13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine, PCV13)

**實施日期**：民國102年3月1日起

**實施對象**：97-100年出生且年滿2歲以上幼童

**條件**：未曾接種或尚未完成PCV13接種

**接種地點**：各地衛生所或衛生單位指定之合約醫院診所

**攜帶證件**：兒童健康手冊、健保IC卡

## ◆疾病介紹

肺炎鏈球菌為人類重要且常見的細菌，可引起厲害的中耳炎、肺炎、菌血症、腦膜炎，嚴重者會導致死亡。任何人都可能感染肺炎鏈球菌，而我國侵襲性肺炎鏈球菌感染症主要發生在5歲以下的幼童和65歲以上老人，其中幼兒又以2-5歲為主，其他不論年齡均可列為高危險群的情形包括免疫功能不全、人工耳植入、慢性心臟或肺部疾病、腎功能衰竭、糖尿病、癌症、沒有脾臟、長期服用類固醇或是接受化學治療、腦脊髓液滲漏的人。

## ◆安全性及副作用

PCV13是一種相當安全的不活化疫苗，接種後少數的人可能發生注射部位疼痛、紅腫的反應，一般於接種2天內恢復。發燒、倦怠等嚴重副作用則極少發生，接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，請醫師做進一步的判斷與處理。

## ◆保護效果

PCV13的保護效力與個人的免疫功能有關，在免疫功能正常的五歲以下兒童，對於PCV13所含肺炎鏈球菌型別的保護效力約為86%。罹患慢性疾病、免疫功能異常等高危險群其效果稍差，但還是值得接種。

## ◆2~5歲幼童公費PCV13接種原則

- 未曾接種過PCV13疫苗者，於2~5歲接種一劑PCV13疫苗。
- 2~5歲前曾接種PCV疫苗(含7價、10價、13價)，但未完成應接種劑次者，於2~5歲接種一劑PCV13疫苗。
- 高危險群幼兒未曾接種PCV13或接種劑次小於(不含)3劑者，提供2劑PCV13，2劑間隔2個月。

※PCV可以和其他疫苗同時接種於不同部位或間隔任何時間接種。

## ◆接種禁忌與注意事項

- 先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分過敏(包括白喉類毒素)曾發生嚴重過敏反應者。
- 發燒或正患急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 出生未滿6週。
- 其他經醫師評估不適合接種者。

