遭疑似感染疱疹 B 病毒（Herpes B virus）獼猴抓咬傷個案之醫療處置建議

衛生福利部疾病管制署（2013.10.15 版）

1. **傷口緊急處置：**遭抓咬傷後，立刻使用肥皂或優碘徹底清潔消毒被猴子接觸的傷口，然後以大量清水沖洗傷口 15 至 20 分鐘。

2. **疱疹 B 病毒感染預防性投藥：**兔子實驗顯示暴露後使用 acyclovir 可有效預防疱疹 B 病毒感染，但尚無人類相關研究證據。美國 CDC 建議提供以下處方之一作為預防性投藥，但須注意下列處方目前不符合我國健保給付規範，個案須自費使用。

   （1） Valacylovir（口服）：建議劑量為 1g every 8 hours for 14 days

   或

   （2） Acyclovir（口服）：建議劑量為 800 mg 5 times daily for 14 days

3. **其他與動物抓咬傷相關疾病（例如：破傷風、細菌感染、狂犬病等）之預防，請醫師依專業評估提供合適醫療處置。**

4. **追蹤建議：**請醫師提醒個案，疱疹 B 病毒潛伏期為 3 天至 3 週，因疱疹 B 病毒發病未治療之死亡率高達 70%，無論是否自費使用預防性投藥，在遭抓咬傷後 3 週內，個案都應監控身體症狀。如果個案在遭抓咬傷後 3 週內出現以下任何症狀，應立刻就醫告知曾被獼猴抓咬傷，以迅速接受治療：

   （1）傷口部位出現水泡或潰瘍

   （2）局部淋巴結腫脹

   （3）發燒伴隨頭痛、惡寒、肌肉痛、吞嚥困難、腹痛、麻痺

參考資料：

1. 衛生福利部疾病管制署網站 http://www.cdc.gov.tw
2. 美國疾病管制預防中心網站 http://www.cdc.gov/herpesbvirus
3. Recommendations for prevention of and therapy for exposure to B virus. Clinical Infectious Diseases 2002 Nov 15;35(10):1191-203.