

103 年 1~5 歲幼童公費 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗接種原則

1. 從未接種過肺炎鏈球菌疫苗，於滿 1-2 歲接種二劑 PCV13，兩劑間隔至少 8 週。
2. 1 歲前曾依下列附表時程接種 PCV7、PCV10 或 PCV13：
 - (1) 完成 1 歲以前應接種劑次者，於滿 1-2 歲追加一劑 PCV13，與前一劑疫苗間隔至少 8 週。
 - (2) 沒有完成 1 歲以前應接種劑次者，於滿 1-2 歲接種二劑 PCV13，與前一劑疫苗間隔至少 8 週，兩劑 PCV13 間隔至少 8 週。
3. 於 1-2 歲才接種 1 劑 PCV7、PCV10 或 PCV13 者，應再接種一劑 PCV13，與前一劑間隔至少 8 週。
4. 未依前述第 1-3 項完成 PCV13 接種者，於滿 2-5 歲接種一劑 PCV13。

附表：PCV7、PCV10、PCV13 的應接種劑次

第一劑接種年(月)齡	接種時程	追加劑	總接種劑次	
1 歲以下	(2~ 6)	3 劑，間隔 8 週	12~15 個月 1 劑	4
	(7~11)	2 劑，間隔 8 週	12~15 個月 1 劑	3
1-2 歲	(12~23)	2 劑，間隔 8 週	無	2
2-5 歲 [#]	(24~71)	1 劑	無	1

高危險群幼童 2 歲前從未接種過 PCV13 或接種劑次不完整且小於 3 劑者，於滿 2 歲至 6 歲前應接種二劑 PCV13，兩劑間隔至少 8 週。