

65歲(含)以上長者 13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及 23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)接種建議

一. 從未接種過：

(一) 接種 1 劑 PPV23 或 PCV13，或

(二) 先接種 1 劑 PCV13，間隔 1 年以上再接種 1 劑 PPV23。

二. 65 歲以後接種過 1 劑(含)以上 PPV23：間隔 1 年以上可再接種 1 劑 PCV13。

三. 65 歲前接種過 1 劑(含)以上 PPV23：

(一) 滿 65 歲後與前一劑 PPV23 間隔至少 5 年再接種 1 劑 PPV23，
或

(二) 間隔至少 1 年接種 1 劑 PCV13，或

(三) 間隔至少 1 年接種 1 劑 PCV13，且與前一劑 PPV23 間隔至少 5 年，可再接種 1 劑 PPV23。

四. 65 歲前接種過 PCV13：滿 65 歲後與 PCV13 至少間隔 1 年後再接種 1 劑 PPV23。

五. 65 歲前接種過 PCV13 與 1 劑(含)以上 PPV23：滿 65 歲後與前一劑 PCV13 間隔 1 年以上，且與前一劑 PPV23 至少間隔 5 年，再接種 1 劑 PPV23。

附件

65 歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種建議

過往接種史	接續接種建議	備註
從未接種	PCV13 PPV23 PCV13 → PPV23	可擇一接種
65 歲之後曾接種 PPV23	→ PCV13	
65 歲以前曾接種以下疫苗		
PPV23	→ PPV23 → PCV13 → PCV13 → PPV23	可擇一接種
PCV13	→ PPV23	
PCV13+PPV23	→ PPV23	與 PCV13 至少間隔 1 年且與前一劑 PPV23 至少間隔 5 年

PCV13=13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗；PPV23=23 價多醣體肺炎鏈球菌疫苗

註：PCV13 與 PPV23 兩劑間隔至少 1 年，兩劑 PPV23 應間隔至少 5 年