

使用說明

Daraprim® 25mg 錠

Pyrimethamine

請詳閱本須知後再服藥。

- 請妥善保管本須知，以備日後不時之需。
- 若對病情或藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥劑師。
- 本藥為依照使用者個人症狀而開立，請勿轉交他人服用，即使症狀看似相同，仍可能造成傷害。
- 出現本須知未列出之副作用或副作用愈發嚴重時，請諮詢醫師或藥劑師。

使用須知：

1. 成分與作用
2. 服藥前注意事項
3. 用用量
4. 可能副作用
5. 存放方法
6. 其他資料

1. 成分與作用

本藥含有 pyrimethamine，該成分屬於抗原蟲劑(antiprotozoal)之一，主要用來治療寄生蟲造成之血液感染症。

作用：

- 預防感染瘧疾，協助對本藥敏感的瘧原蟲(Plasmodium)肆虐區域居民以預防感染瘧疾。請牢記唯有在醫師、藥劑師或旅遊診所建議下才服藥。本藥不一定適用於所有瘧疾疫區。
- 治療弓漿蟲(*Toxoplasma*)引發之感染症，這些感染症可能影響：
 - (腦炎)和其他身體部位：患者免疫系統能力低下(愛滋病導致)時。
 - 眼部：感染將對視力造成影響。
 - 胎兒：從懷孕母體傳染至胎兒。請諮詢醫師進一步說明這些症狀。

2. 服藥前注意事項

符合下列條件者，請勿服藥：

- 對 pyrimethamine 或其他成分過敏(高度敏感)(詳第 6 點：其他資訊)
- 未滿 5 歲兒童

若有任何疑慮，請在服藥前，先

行諮詢醫師或藥劑師。

特別注意事項

服藥前，請向醫師或藥劑師確認：

- 無肝腎問題
- 無貧血問題
- 癲癇曾經發作

同時服用其他藥物

使用者若正在服用其他藥物，或者近期曾服用過任何藥物，包括未經醫師處方而購買之成藥和草藥，請告知醫師或藥劑師。本藥與部分藥物會相互影響藥物作用途徑。

尤其是有服用下述藥物時，請告知醫師：

- 抗生素：trimethoprim 或 co-trimoxazole
- 抗瘧疾藥：proguanil 或奎寧硫酸鹽(quinine sulphate)
- 愛滋用藥：zidovudine
- 癌症用藥：methotrexate、daunorubicin 或 cytosine
- 安眠或肌肉鬆弛用藥：lorazepam
- 抗凝血劑：warfarin
- 胃灼熱或胃藥：制酸劑
- 腹瀉用藥：含 kaolin 成分之藥物

不瞭解上述藥物是否適用時，請在服用本藥前，先行諮詢醫師或藥劑師。

懷孕與哺乳

懷孕已滿或未滿 12 週的婦女，請勿服藥以免傷害胎兒。懷孕 12 週以上或準備懷孕的婦女，請在服藥前告知醫師。請勿在服藥期間哺乳，請諮詢醫師或助產士建議。

3. 用法用量

請切實依照醫師指示服藥。若有任何疑問，請諮詢醫師或藥劑師。

- 請搭配水服藥

任何抗瘧疾藥都無法提供完整保護。所以，請一併確認下列事項：

- 覆蓋外露皮膚
- 使用防蚊液或蚊帳

瘧疾

為協助預防感染瘧疾，一般用量依年齡而定：

- 成人與 10 歲以上兒童：每次

1 錠，每週 1 次

- 5-10 歲兒童：每次半錠，每週 1 次
- 5 歲以下兒童：不得服藥
- 請在前往瘧疾疫區前當週，開始服用第 1 錠
- 在疫區期間，每週服用規定藥量
- 回國後，繼續每週服藥，共持續 4 週。

弓蟲症

本藥必須連同另一種抗生素 sulphonamide 和葉酸補充劑(維他命)一併服用。

成人與 5 歲以上兒童

為治療弓蟲症：

- 必須持續服藥 3-6 週
- 需要追加療程時，療程之間應間隔 2 週
- 治療免疫系統能力低下或愛滋病者的大腦(腦炎)和其他器官感染症時，一般用量為：
 - 前 2-3 天為每天 4-8 錠
 - 後續療程天數為每天 1-4 錠
- 治療眼部感染的一般用量：
 - 前 1-2 天為每天 4 錠
 - 後續療程天數為每天 1-2 錠

至於新生兒，服藥能阻止感染弓蟲症的母體繼續危害胎兒。

- 懷孕 13 週起用量：每天 1-2 錠
- 服用本藥可能危害未滿 12 週的胎兒。此時請改服其他藥物，直至懷孕時間滿 13 週為止。

服用過多劑量時

請諮詢醫師或藥劑師且出示本藥包裝。

忘記服藥時

- 忘記服用一次劑量時，只要在想起來之時，盡快服用即可。
- 若想起來時為服用下次劑量之時，請直接服藥，略過遺漏劑量。
- 請勿試圖服用兩次劑量以彌補遺漏劑量。

4. 可能副作用

儘管不是人人都會發生，本藥仍如同所有藥物一般，有可能造成副作用。

發生下列任何副作用或症狀時，

請即刻告知醫師：

- 喉嚨痛、突發不適或皮膚反應，例如發疹或刺激。
- 異常瘀青、疲累、虛弱、頭暈或呼吸困難。

此時請立刻告知醫師，這些症狀可能代表體內紅血球數下降，導致出血和瘀青風險升高，造成體內難以對抗感染症。醫師將進行驗血以確認此點，必要時會給予適當治療。

本藥可能導致癲癇患者發病。癲癇患者請在服藥前告知醫師或藥劑師。

當使用者已取得本藥處方，而在前往瘧疾疫區期間或回國後感到不適時，若不清楚不適起因，請告知醫師或藥劑師。

使用者取得本藥處方以治療弓蟲症時，請檢查處方說明是否包括抗生素 sulphonamide，該藥應一併開立。

若有任何副作用惡化或變得嚴重，亦或是出現本須知未列出的副作用，請告知醫師或藥劑師。

5. 存放方法

- 請將本藥放在兒童無法觸及看見的場所。
- 本藥超出包裝所示使用期限時，請勿服用。使用期限係指該月份最後一日。
- 請將本藥放入原有包裝，存放在 30°C 以下的陰涼場所。
- 不得將藥物扔入下水道或家用污水處理池丟棄，請向藥劑師詢問如何處理無用藥物。此舉有助於環保。

6. 其他資訊

本藥成分：

- 活性成分為 pyrimethamine。每錠含有 25 mg。
- 其他成分為 lactose monohydrate、maize starch、hydrolysed starch、docusate sodium 與 magnesium stearate。

GlaxoSmithKline AG

3053 Münchenbuchsee

Switzerland