

日期：2017 年第 6 週(2017/2/5-2/11)

DOI : 10.6524/EB.20170221.33(4).003

疫情概要：


國內流感重症通報數整體呈下降趨勢，門急診類流感就診病例百分比降至農曆春節前水準；社區流感病毒以 H3N2 為主，近期 95% H3N2 病毒與本季疫苗株吻合，目前尚無檢出抗藥性病毒株，各地日夜溫差仍大，預測疫情將持平；惟國內首度發生 H5N6 流感禽類疫情，需針對禽場及防疫相關人員加強防護與監測，嚴防人類病例發生。

中國大陸 H7N9 流感進入流行期，持續新增病例，目前累計病例數已為歷年同期最高，另 H5N6 流感病例自 2014 年迄今累計 17 例，為散發疫情，致死率達七成。全球累計 70 國家／屬地出現茲卡病毒本土病例，中、南美及加勒比海地區茲卡疫情持續，新加坡仍有新增病例，我國茲卡境外移入及本土病例發生風險存在。

一、流感

(一)國內疫情

1. 流感輕症：門急診類流感就診病例百分比較前一週下降，與農曆春節前相當。
2. 流感併發重症：較前一週略升，惟近期整體呈下降趨勢。本流感季累計 313 例流感重症確定病例（85% H3N2、3% H1N1、6% A 未分型、5% B 型、1% H3N2&B 型），其中 43 例經審查與流感相關死亡（32 例 H3N2、2 例 H1N1、5 例 A 未分型、3 例 B 型、1 例 H3N2&B 型）。
3. 社區流感病毒型別以 H3N2 為主，近 4 週抗原性監測資料顯示 95% H3N2 病毒與本流感季疫苗株吻合。尚無檢出抗藥性病毒株。



圖一、近 2 個流感季類流感門急診監測

(二)國際疫情

趨勢 國家	2016-2017年流感季				
	活動度	週別	監測值	主要流行 型別	疫苗吻合度
美國	上升 (流行期)	第5週	陽性率：20.9%	H3N2型	H3N2型及B/Vic分別為 97%、91%·餘均相似
香港	上升	第5週	陽性率：8.63%	H3N2型	-
日本	處高點 (流行期)	第5週	定醫平均報告數： 38.14	H3N2型	H3N2型、H1N1型、 B/Vic及B/Yam分別為80%· 99%、99%、100%相似
歐洲	處高點 (流行期)	第5週	定點陽性率：45%	H3N2型	H3N2及B型與本季疫苗株 相似· H1N1型多與南半球下季 疫苗株相似
加拿大	處高點 (流行期)	第5週	陽性率：24.3%	H3N2型	各型別均相似
韓國	下降 (流行期)	第5週	門診就診千分比：9.9	H3N2型	H3N2型均相似
中國大陸	下降 (流行期)	第4週	陽性率：全國16.1% (南方10.3%·北方23%)	H3N2型	H3N2型及B/Yam分別為 97%、93%·餘均相似

二、人類新型 A 型流感—H7N9 流感**(一)H7N9 流感****1.中國大陸**

- (1)病例數持續增加，公布新增 56 例，以浙江省、江蘇省及安徽省為多；另雲南省及北京市（河北省移入）公布本季首例病例。
- (2)本季入秋(2016/10/1)迄今累計 365 例，以江蘇省 115 例、浙江省 65 例、廣東省 41 例及安徽省 39 例為多；個案多具禽類、活禽市場暴露史，50 歲以上族群為主。
- (3)11 月至次年 5 月為流行季，本季 12 月及 1 月病例快速攀升，目前累計病例數已為歷年同期最高。

- 2.全球：自 2013 年迄今累計 1,163 例，世界衛生組織(WHO) 1/16 更新統計，累計 359 例死亡。

(二)H5N6 流感**1.中國大陸**

- (1)本季入秋累計 2 例，分布於湖南省及廣西壯族自治區，均為去年 11 月發病。
- (2)2017 年 1/31 公布，自 2014 年起累計 17 例，均為散發，分布於廣東省、湖南省、雲南省等 8 個省分，多為重症，其中 12 例死亡，致死率 70%；逾七成個案為 20-49 歲；逾八成具禽類或活禽市場暴露史。

- 2.全球：目前僅中國大陸有通報病例。

- 3.國內首度發生 H5N6 流感禽類疫情，將加強禽場及防疫相關人員防護與監測。

三、茲卡病毒感染症

(一)國際疫情

1. **美國本土疫情**：佛羅里達州、德克薩斯州無新增病例，分別累計 262 例、7 例本土病例。
 2. **中、南美及加勒比海地區**：疫情持續，近三個月於加勒比海地區蒙哲臘（英國海外領地）、中美洲巴拿馬、南美洲委內瑞拉、巴拉圭及秘魯病例呈增加趨勢，其餘國家多呈持平或下降趨勢。
 3. **其他東南亞國家本土疫情**
 - (1) **新加坡**：新增 2 例；2016 年截至 2017/2/13 累計 459 例，含 17 名孕婦；目前無群聚區。
 - (2) **其他東南亞國家**：無新增病例，分別累計泰國 728 例、越南 212 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。
 4. **全球**：世界衛生組織(WHO)公布 2015 年至 2017 年 2/1 累計 70 國家／屬地出現本土流行疫情。
 - (1) **66 個國家／屬地持續具流行疫情或可能有本土傳播**：新增安哥拉；包括泰國、菲律賓、越南、印尼、新加坡、馬來西亞、馬爾地夫 7 國。
 - (2) **4 個國家曾有疫情，惟 2016 年尚未報告病例**：寮國、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、萬那杜。
 - (3) **13 國出現性傳播本土病例**：美、加、義、法、葡、紐、德、阿根廷、智利、秘魯、西班牙、荷蘭及英國。
 - (4) **具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案或 GBS 病例／發生率增加國家**：分別為 29 國、21 國。
- (二) **國內疫情**：今年尚無確定病例；2016 年累計 13 例，均為境外移入，感染國家分別為泰國 4 例、越南及馬來西亞各 2 例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁及美國（佛州邁阿密）各 1 例。

四、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省、雲南省、廣西、貴州省	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2017/1/3
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/8/18

字粗體：疫情更新

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、 越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 國家：斯里蘭卡	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2016/8/16
麻疹	中國大陸、哈薩克、剛果民主 共和國、獅子山、奈及利亞、 印度、羅馬尼亞			2016/11/1
中東呼吸症候 群冠狀病毒感 染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	北美洲 1 國、中南美洲 47 國/ 屬地、大洋洲 8 國/屬地、 亞洲 7 國、非洲 3 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/1/23
	亞洲 1 國、大洋洲 3 國/屬地	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2016/10/28
拉薩熱	奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/2/14
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/1/17

字粗體：疫情更新

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>