

日期：2017 年第 3-5 週(2017/1/15-2/4)

DOI：10.6524/EB.20170214.33(3).003

疫情概要：


國內流感重症通報數呈現下降趨勢，春節連假門急診類流感就診病例百分比較連假前上升，但較往年春節期間明顯降低；社區流感病毒以 H3N2 為主，近期 92% H3N2 病毒與本季疫苗株吻合，目前尚無檢出抗藥性病毒株；氣象預報將有一波冷氣團，不排除疫情較農曆春節之前略升。

中國大陸 H7N9 流感進入流行期，去年 12 月至今年 1 月病例快速增加，目前累計病例數已為歷年同期最高。全球累計 70 國家／屬地出現茲卡病毒本土病例；美國佛羅里達州及德克薩斯州卡梅倫郡近期仍有本土病例出現，中、南美及加勒比海地區疫情持續，菲律賓、新加坡仍有新增病例，我國茲卡境外移入及本土病例發生風險存在。巴西黃熱病疫情持續，WHO 預期疫情可能擴散且傳播風險高，建議欲前往風險地區者加強疫苗接種。

一、流感

(一)國內疫情

1. 流感輕症：第 4-5 週為農曆春節連假，門急診類流感就診病例百分比較連假前上升，惟較往年春節期間降低。
2. 流感併發重症：通報數呈現下降。本流感季累計 298 例（85% H3N2 型、3% H1N1 型、6% A 未分型、5% B 型、1% 同時感染 H3N2 及 B 型），其中 42 例經審查與流感相關死亡病例（31 例 H3N2 型、2 例 H1N1 型、5 例 A 未分型、3 例 B 型、1 例同時感染 H3N2 及 B 型）。
3. 社區流感病毒型別以 H3N2 為主，近 4 週抗原性監測資料顯示 92% H3N2 病毒與本流感季疫苗株吻合。尚無檢出抗藥性病毒株。



圖一、近 2 個流感季類流感門急診監測

(二)國際疫情

國家	2016-2017年流感季				
	活動度	週別	監測值	主要流行型別	疫苗吻合度
美國	上升 (流行期)	第4週	陽性率：18%	H3N2型	H3N2型及B/Vic分別為97%、91%，餘均相似
日本	上升 (流行期)	第4週	定醫平均報告數： 39.41	H3N2型	H3N2型、H1N1型、B/Vic及B/Yam分別為80%、99%、99%、100%相似
香港	上升	第4週	陽性率：8.83%	H3N2型	-
歐洲	處高原期 (流行期)	第4週	定點陽性率：51%	H3N2型	H3N2及B型與本季疫苗株相似，H1N1型則均與南半球下季疫苗株相似
加拿大	下降 (流行期)	第4週	陽性率：23%	H3N2型	各型別均相似
韓國	下降 (流行期)	第4週	門診就診千分比：12.5	H3N2型	H3N2型均相似
中國大陸	下降 (流行期)	第3週	陽性率：全國19.3% (南方14.8%、北方24.3%)	H3N2型	H3N2型及B/Yam分別為97%、93%，餘均相似

二、人類新型 A 型流感—H7N9 流感**(一)中國大陸**

1. 病例數持續增加，1/16 以後報告世界衛生組織(WHO)共 72 例，以江蘇省、湖南省及廣東省為多；另遼寧省、四川省及廣西壯族自治區公布本季首例病例。
2. 本季入秋(2016/10/1)迄今累計 309 例，以江蘇省 105 例、浙江省 53 例、廣東省 36 例及安徽省 33 例為多；個案多具禽類、活禽市場暴露史，50 歲以上族群為主。
3. 11 月至次年 5 月為流行季，本季 12 月及 1 月病例快速攀升，目前累計病例數已為歷年同期最高。

(二)全球：自 2013 年迄今累計 1,101 例，截至今年 1/16 累計 359 例死亡。

三、茲卡病毒感染症**(一)國際疫情**

1. 美國本土疫情：佛羅里達州、德克薩斯州近 2 週共增 4 例，分別累計 262 例、7 例本土病例。
2. 中、南美及加勒比海地區：疫情持續，近三個月於中美洲貝里斯、巴拿馬、南美洲玻利維亞、巴拉圭及秘魯病例呈增加趨勢，其餘國家多呈下降趨勢。
3. 其他東南亞國家本土疫情
 - (1) 菲律賓：近期新增 5 例；2016 年截至今年 2/2 累計 57 例，含 7 名孕婦。
 - (2) 新加坡：第 3 週新增 1 例；2016 年迄今累計 457 例，17 名孕婦感染；目前無群聚區。
 - (3) 其他東南亞國家：上週無新增病例，分別累計泰國 728 例、越南 212 例、馬來西亞 8 例。

4.全球：世界衛生組織(WHO)公布 2015 年至 2017 年 2/1 累計 70 國家／屬地出現本土流行疫情。

(1)66 個國家／屬地持續具流行疫情或可能有本土傳播：新增安哥拉；包括泰國、菲律賓、越南、印尼、新加坡、馬來西亞、馬爾地夫 7 國。

(2)4 個國家曾有疫情，惟 2016 年尚未報告病例：寮國、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、萬那杜。

(3)13 國出現性傳播本土病例：美、加、義、法、葡、紐、德、阿根廷、智利、秘魯、西班牙、荷蘭及英國。


(4)具茲卡相關之小頭症/先天性畸形個案或 GBS 病例/發生率增加國家：分別為 29 國、21 國。

(二)國內疫情：2017 年第 3-5 週無新增病例；2016 年累計 13 例，均為境外移入，感染國家分別為泰國 4 例、越南及馬來西亞各 2 例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁及美國（佛州邁阿密）各 1 例。

四、黃熱病

(一)巴西：疫情持續，今年截至 2/1 累計通報 820 例疑似病例，其中 147 例確診，140 例死亡，以東南部米納斯吉拉斯州佔近 9 成最多，鄰近之聖埃斯皮里圖州、聖保羅州亦出現病例。

(二)WHO 1/31 風險評估表示，因病例數持續增加且新增感染州別、人口與動物之流動、部分地區疫苗覆蓋率低等因素，預期疫情可能擴散且傳播風險高；目前已將巴伊亞州(Bahia State)南部及西南部部分行政區、聖埃斯皮里圖州 (Espírito Santo State, 除維多利亞市區以外全區)、里約熱內盧州(Rio de Janeiro State)北方部分行政區新增為風險地區，建議欲前往旅客應加強疫苗接種。



圖二、巴西黃熱病預防接種建議地圖

五、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
人類禽流感	中國大陸	浙江省、廣東省、安徽省、湖南省、上海市、江西省、江蘇省、四川省、福建省、山東省、湖北省、河北省、北京市、天津市、遼寧省、河南省、雲南省、廣西、貴州省	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2017/1/3
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/8/18
登革熱	東南亞地區 9 個國家：印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/8/16
麻疹	中國大陸、哈薩克、剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、印度、羅馬尼亞				2016/11/1
中東呼吸症候群 冠狀病毒感 染症 (MERS)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家：阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	北美洲 1 國、中南美洲 47 國／屬地、大洋洲 8 國／屬地、亞洲 7 國、非洲 3 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2017/1/23
	亞洲 1 國、大洋洲 3 國／屬地		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/10/28
拉薩熱	奈及利亞、多哥		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/6/14
黃熱病	巴西		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17

字粗體：疫情更新

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2017;33:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫、劉繡蘭

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>