

安全注射執行情形查檢表

縣市別：_____ 醫療機構名稱：_____

安全注射行為	執行情形		備註
	是	否	
準備和施打注射藥物前應執行手部衛生			
以無菌操作技術在乾淨區域準備注射藥物 (乾淨區域指不會接觸到血液、體液、污染的儀器設備或受到其污染的區域)			
注射針和針筒只能使用於單一病人 (包括預先填充藥品的針筒(prefilled syringes)和匣式設備(cartridge devices)如胰島素注射器)			
以注射針穿刺藥瓶的橡膠軟塞前，應先使用酒精消毒軟塞			
應使用新的注射針和針筒進入藥瓶抽取藥品，即使是同一位病人需要增加取用的劑量			
單一劑量包裝或單次使用的小瓶裝、安瓿裝、瓶裝、袋裝靜脈注射藥品僅限單一病人使用			
注射藥品使用的管路(tubing)和轉接器(connector)僅限單一病人使用			
多劑量包裝*的藥品在首次開封後應標註開封日期，並且在開封後 28 天內丟棄；若廠商說明書指示開封後可存放的天數比 28 天長或短，應依廠商說明使用			
如果可能，多劑量包裝藥品最好僅提供給單一病人使用			
多劑量包裝藥品如果要提供給不只一位病人使用，應集中存放在乾淨區，不可以帶到病人治療區			

*勿以藥品包裝體積做為單一劑量或多劑量包裝的判斷依據；單一劑量包裝通常不含防腐劑(preservative)，因此使用後殘餘藥品應立即丟棄；對於藥品包裝屬單一劑量或多劑量包裝如有疑問，應洽廠商提供說明。另，多劑量包裝藥品開封後若對其無菌狀態有所疑慮，即使尚在開封後可存放期限內，仍應立即丟棄。

查核人員簽章：_____

稽查日期：_____年_____月_____日