

日期：2018 年第 9-10 週(2018/2/25-3/10)

DOI：10.6524/EB.201803_34(6).0004


疫情概要：

我國流感疫情逐漸趨緩，惟仍處流行期；社區檢出流感病毒以 B 型 Yamagata 為主。腸病毒疫情處相對低點，惟近期呈小幅上升。

美國、歐洲、日本、韓國及中國大陸北方流感疫情目前已明顯下降；仍處高峰期的加拿大、香港、中國大陸南方疫情亦呈現下降趨勢；流行病毒型別仍多樣。阿曼出現今年首例 MERS 病例，另沙烏地阿拉伯利雅德省疑似發生醫院群聚感染事件。菲律賓及法國麻疹病例增加，基於當地感染風險升高，我國於 3/13 提升兩國麻疹旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)；另依世界衛生組織更新之茲卡流行疫情國家分類，調整相關國家旅遊疫情建議等級。

一、流感**(一) 國內疫情**

1. 流感輕症：門急診類流感就診人次呈下降趨勢，第 10 週門急診類流感就診達 102,741 人次，較第 9 週下降 11%。
2. 流感併發重症：通報數呈下降趨勢；自 2017 年 10/1 起累計 610 例流感併發重症病例（80% 感染 B 型），其中 88 例經審查與流感相關死亡病例（88% 感染 B 型）。
3. 近期社區流感病毒陽性件數呈下降趨勢，檢出流感病毒以 B 型 Yamagata 為主，惟 B 型佔率呈小幅下降。



圖一、近二個流感季門急診類流感就診人次監測

(二) 國際疫情

國家	2017-2018年流感季				
	活動度	週別	監測值	近期主要流行型別	疫苗吻合度
加拿大	下降·處高峯期	第9週	陽性率：30%	B型、H3N2	各型別多相似
香港	下降·處高峯期	第9週	陽性率：21.13%	B型	-
歐洲	下降	第9週	定點陽性率：48.7%	B/Yam	各型別多相似
美國	下降	第9週	陽性率：17.7%	B型、H3N2	各型別多相似
韓國	下降	第9週	門診就診千分比：15.1‰	B/Yam、H3N2	-
日本	下降	第9週	定醫平均報告數：17.42	B/Yam	H3N2型吻合度低· 餘各型別相似
中國大陸	南方 下降·處高峯期	第9週	南方陽性率：31.5%	H1N1、B/Yam	各型別多相似
	北方 下降		北方陽性率：17.8%	H1N1、B/Yam	
新加坡	下降	第9週	陽性率：37%	B型、H1N1	-

二、腸病毒**(一) 國內疫情**

1. 尚處低點：第 10 週全國門急診腸病毒就診達 3,696 人次，呈小幅上升。
2. 新增 2 例腸病毒併發重症病例，感染克沙奇 B1 型及 B2 型各 1 例；今年累計 4 例，分別感染克沙奇 B1 型 2 例、克沙奇 B2 型及克沙奇 A4 型各 1 例；2017 年累計 24 例，以感染腸病毒 D68 型 12 例為多。
3. 近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 型為多，社區持續有腸病毒 71 型活動。

三、茲卡病毒感染症**(一) 國際疫情****1. 東南亞國家**

- (1) 新加坡：無新增病例，2018 年累計 1 例，目前無群聚區。該國 2017 年累計 67 例；2016 年至 2018 年 3/9 累計 524 例。
- (2) 其他國家：2017 年越南 27 例；2016 年泰國 728 例、越南 232 例、菲律賓 57 例、馬來西亞 8 例。

2. 全球：世界衛生組織(WHO)公布 2015 年起累計 71 國家／屬地出現本土流行疫情

- (1) 27 個國家／屬地自 2015 年後持續具本土流行疫情，多位於加勒比海周邊，另包括亞洲新加坡旅遊疫情建議列為警示(Alert)；秘魯、越南、菲律賓因傳播未阻斷惟未見新波段疫情，我國 3/13 調降旅遊疫情建議至注意，另美國先前疫情傳播已中斷，故解除該國旅遊疫情建議。

(2) 44 個國家／屬地傳播未阻斷，惟未見新波段疫情，多位於中南美洲，另包括印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印度、馬爾地夫、緬甸、越南、菲律賓等 11 個亞洲國，旅遊疫情建議列為注意(Watch)。

(3) 31 國具茲卡相關之小頭症／先天性畸形個案。

(4) 23 國具 GBS 病例或發生率增加國家。

(5) 13 國出現性傳播本土病例。

(二) 國內疫情：2018 年尚無病例；2017 年累計 4 例；2016 年迄今累計 17 例，均為境外移入，感染國家為泰國及越南各 4 例、馬來西亞 2 例，印尼、新加坡、菲律賓、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各 1 例。

四、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

(一) 國際疫情

1. 沙烏地阿拉伯：新增 12 例（2 例死亡）及 2 例先前通報個案死亡，以中部利雅德省 8 例為多，該省疑似發生醫院群聚感染，包括 4 例住院病患及 1 例醫護人員；其他病例多曾接觸駱駝。該國迄今累計 1,814 例，736 例死亡。

2. 阿曼：WHO 3/9 公布今年首例病例，為北部巴提奈(Batinah)區男性，2/15 發病，3/1 確診，住家周圍有駱駝農場糧倉。當局已針對接觸者及相關醫護人員進行追蹤。

3. 全球：自 2012 年 9 月迄今累計 2,143 例，750 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，逾 80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。

(二) 國內疫情：自 2012 年起累計通報 19 例，均排除感染。

五、麻疹

(一) 菲律賓：今年截至 2/3 累計 877 例疑似病例，包含 12 人死亡，病例數為去年同期 3 倍，多分布於南部地區，其中三寶顏市(Zamboanga)及達沃市(Davao)因病例數增加且達流行閾值，宣布爆發疫情。

(二) 法國：今年截至 2/20 累計 429 例，自 2013 年以來同期最高，其中 1 名 30 多歲女性死亡，19 人因肺炎住院（含 6 例於 ICU 治療），7 成病例集中於西南部新阿基坦大區。

(三) 基於當地感染風險增加，我國 3/13 提升菲律賓、法國麻疹旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。

六、**狂犬病**：泰國今年截至 2/19 累計 2 人死亡；全境累計 330 例動物陽性件數，已超出 2014 年全年總數，其中 13 個省已被列入高風險紅區，包括曼谷、暖武里府等地。當局表示每年 3-6 月為高峰期，每年至少有 10 人死於狂犬病。

七、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型 流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、湖南省、 江蘇省、福建省、河北省、 陝西省、廣西壯族自治區、 內蒙古自治區、新疆維吾爾 自治區、貴州省、遼寧省、 雲南省	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2017/12/5
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/12/5
	印尼				
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、 印度、泰國、哈薩克、 菲律賓 ； 非洲國家：剛果民主共和國、 獅子山、奈及利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼亞、 烏克蘭、希臘、英國、塞爾維亞、 法國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/3/13
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	亞洲 1 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/3/13
	亞洲 11 國、美洲 21 國、 非洲 10 國、大洋洲 2 國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/3/13
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/2/13

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
鼠疫	馬達加斯加	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/10/11
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984年12月15日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路6號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2018;34:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>