

日期：2018 年第 27–28 週(2018/7/1–7/14) DOI：10.6524/EB.201807\_34(14).0004

### 疫情概要：


我國腸病毒疫情仍處流行期，近 2 週呈下降趨勢，已過高峰；近 4 週社區腸病毒檢出型別以伊科病毒 11 型為多，惟近期腸病毒 71 型個案增加，需持續保持警覺。日本腦炎病例持續出現，分布於全台多個縣市，個案住家或活動地附近多有病媒蚊孳生高風險環境。國內北部出現登革熱本土病例；近期高溫降雨，且東南亞國家登革熱疫情升溫，境外移入及本土疫情風險增加。

日本、香港及新加坡近期腸病毒疫情上升，中國大陸、澳門、韓國及泰國處高峰。泰國、柬埔寨、馬來西亞及斯里蘭卡登革熱疫情上升。剛果民主共和國伊波拉疫情自 6 月初起無新增確診病例，該國持續加強監測及追蹤計畫。

## 一、腸病毒

### (一) 國內疫情

1. 第 28 週全國健保腸病毒門急診就診計 10,988 人次，較前一週下降 8.4%，近 2 週疫情呈下降趨勢，疫情已過高峰，惟仍處流行期。
2. 新增 2 例腸病毒感染併發重症病例，其中 1 例死亡。今(2018)年累計 20 例，其中 9 例為新生兒（含 6 例死亡）；重症感染型別多樣，感染伊科病毒 11 型 9 例，克沙奇 A4 型、克沙奇 B1 型及腸病毒 71 型各 2 例，克沙奇 A9 型、克沙奇 A16 型、克沙奇 B2 型、克沙奇 B3 型各 1 例，另有 1 例同時檢出腸病毒 71 型及克沙奇 A16 型；去(2017)年累計 24 例（含 1 例死亡），以感染腸病毒 D68 型 12 例為多。
3. 近 4 週社區腸病毒檢出型別以伊科病毒 11 型為多，惟近期腸病毒 71 型個案增加，以輕症為主；今年累計 47 例腸病毒 71 型散發個案。




圖一、2017–2018 年腸病毒健保門急診就診人次趨勢

**(二) 國際疫情**

國家	累計數	疫情趨勢	2018年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
澳門		下降·處高峰	6/23	1,501	高於2012-16年同期均值
中國大陸		處高峰	7/1	1,008,516(22)	高於近3年同期
新加坡		上升·高於流行閾值	7/7	22,746	高於去年同期
韓國		上升·處高峰	7/7	門診就診千分比:24.9	高於去年同期
泰國		上升·處高峰	7/9	24,466(0)	高於去年同期
日本		上升	7/1	36,032	低於去年同期
香港		上升	7/7	急診就診千分比:1.7	低於去年同期
越南		持平·低於流行閾值	6/23	19,125(0)	低於去年同期

**二、登革熱****(一) 國內疫情**

1. 本土病例：今年迄 7/15 累計 2 例，個案居住地分別為高雄市及新北市；去年共 10 例。
2. 境外移入病例：今年迄 7/15 累計 107 例，為 2014 年至 2018 年同期次低，近一個月境外移入病例感染國家以柬埔寨、馬來西亞及泰國等東南亞國家為多；去年共 333 例。




圖二、2017-2018 年登革熱病例通報趨勢

## (二) 國際疫情

國家	趨勢	疫情趨勢	2018年		
			截止點	報告數(死亡數)	備註
泰國		上升·處相對高點	7/8	28,732(37)	高於去年同期
柬埔寨		上升·高於閾值	6/23	2,159	
馬來西亞		上升	6/30	32,435(53)	
斯里蘭卡		上升	7/13	27,591	
新加坡		持平·處低水平	7/7	1,437	
中國大陸		持平·處低水平	5/31	135(0)	
寮國		略降	6/23	1,461(4)	
越南		下降·處低水平	6/12	22,842(5)	

## 三、日本腦炎

- (一) 現處流行季節，近期通報病例數仍處高點；新增 7 例確定病例，個案居住地為新北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及花蓮縣各 1 例。
- (二) 今年迄 7/16 累計 26 例，個案居住地分布於 13 個縣市，分別為高雄市 8 例、嘉義縣及台南市各 3 例、彰化縣及南投縣各 2 例，新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣各 1 例；個案住家或工作地／活動地附近多有病媒蚊孳生高風險環境。2012 至 2017 年同期病例數分別為 26、15、12、24、16 及 19 例。
- (三) 我國每年 5 至 10 月為流行季節，其中又以 6 至 7 月為流行高峰；近年各縣市多曾出現散發病例，以 40 歲以上成人為多。



圖三、2012-2018 年日本腦炎確定病例趨勢

#### 四、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

##### (一) 國際疫情

1. 沙烏地阿拉伯今年 6 月累計新增 4 例，其中 1 例死亡，個案相關資訊尚未公布，僅知皆非醫護人員或院內感染。
2. 今年迄今曾公布病例國包括沙烏地阿拉伯、阿曼、阿拉伯聯合大公國及馬來西亞（為境外移入病例）。世界衛生組織(WHO) 7/10 更新全球自 2012 年 9 月起累計 2,229 例，791 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，逾 80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。

(二) 國內疫情：自 2012 年起累計通報 20 例，均排除感染。

#### 五、伊波拉病毒感染

(一) 剛果民主共和國西北部赤道省自 6/2 起無新增確診病例，4/4-7/9 累計 53 例（38 例確診、15 例極可能；5 名醫護人員），包含 29 人死亡，病例分布於比科羅(Bikoro)、伊波克(Iboko)及萬佳達(Wangata)等 3 個區域。

(二) WHO 表示已完成所有接觸者 21 天監測期，惟尚有未被發現的傳播鏈及男性倖存者經性行為傳播病毒的可能性，有再現或突然爆發疫情的風險，然剛果民主共和國當局已加強監測機制及倖存者追蹤計畫，應能快速因應此類事件。WHO 於 7/9 評估維持剛果民主共和國國內傳播風險為中、區域及全球為低。

#### 六、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型 流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、福建省、北京市	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/5/15
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/5/15
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、印度、泰國、哈薩克、菲律賓； 非洲國家：剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、希臘、英國、塞爾維亞、法國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/3/13

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	亞洲 1 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/3/13
	亞洲 11 國、美洲 21 國、 非洲 10 國、大洋洲 2 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2018/3/13
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2018/2/13
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/12/2 6
伊波拉 病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/5/15

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2018;34:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>