

日期：2018 年第 24–26 週(2018/6/10–6/30) DOI：10.6524/EB.201807_34(13).0003

疫情概要：

我國目前仍處腸病毒流行期；近期社區腸病毒檢出型別以伊科病毒 11 型為多，持續有腸病毒 71 型病毒活動。日本腦炎新增病例仍多，個案以中部以南地區為主，住家或活動地附近多有病媒蚊孳生高風險環境。國內出現今年首例登革熱本土病例，近期氣溫偏高且有降雨，另東南亞國家疫情逐漸升溫，本土及境外移入風險增加。

近期韓國、日本、泰國及越南腸病毒疫情上升，中國大陸及澳門處高峰；泰國、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡登革熱疫情呈上升趨勢。印度西南部立百病毒感染疫情，自 6 月初起已無新增確診病例，當局宣布目前已全面控制立百病毒感染疫情。剛果民主共和國進入伊波拉疫情監測期。

一、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 第 26 週全國健保腸病毒門急診就診計 12,378 人次，較前一週上升，疫情仍處流行期。
2. 新增 6 例腸病毒感染併發重症病例，感染伊科病毒 11 型 4 例、克沙奇 A4 型及 A9 型各 1 例。今年累計 18 例，其中 8 例為新生兒（含 4 例死亡）；重症感染型別多樣，感染伊科病毒 11 型 8 例，克沙奇 A4 型、克沙奇 B1 型及腸病毒 71 型各 2 例，克沙奇 A9 型、克沙奇 A16 型、克沙奇 B2 型及克沙奇 B3 型各 1 例；去(2017)年累計 24 例(含 1 例死亡)，以感染腸病毒 D68 型 12 例為多。
3. 近 4 週社區腸病毒檢出型別以伊科病毒 11 型為多；另今年已出現 31 例腸病毒 71 型散發個案，顯示社區中持續有腸病毒 71 型病毒活動。



圖一、2017–2018 年腸病毒健保門急診就診人次趨勢


(二) 國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2018年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
澳門		下降·處高峰	6/16	986	與2012-16年同期均值相當
中國大陸		下降·處高峰	6/17	831,360(13)	高於近3年同期
新加坡		持平	6/23	20,786	高於去年同期
韓國		上升	6/23	門診就診千分比:13.5	與去年同期相當
日本		上升	6/17	27,048	略低於去年同期
泰國		上升	6/25	18,579(0)	與去年同期相當
香港		處基線水平	6/23	急診就診千分比:1.3	略高於去年同期
越南		上升·低於流行閾值	6/16	16,796(0)	略低於去年同期

二、登革熱

(一) 國內疫情

1. 本土病例：出現今年首例本土病例，為高雄市個案。今年迄 7/1 累計 1 例；去年共 10 例。
2. 境外移入病例：今年迄 7/1 累計 94 例，為 2014 年至 2018 年同期次低，近一個月境外移入病例感染國家以柬埔寨、菲律賓及泰國等東南亞國家為多；去年共 333 例。



圖二、2017-2018 年登革熱病例通報趨勢

(二) 國際疫情

趨勢 國家	疫情趨勢	2018年		
		截止點	報告數(死亡數)	備註
泰國	上升·處相對高點	6/25	22,539(29)	高於去年同期
柬埔寨	上升·高於閾值	6/12	1,488	
寮國	上升	6/12	849	低於去年同期·與前年同期相當
斯里蘭卡	略升·處低水平	6/29	24,603	
新加坡	持平·處低水平	6/23	1,303	
中國大陸	持平·處低水平	5/31	135(0)	
馬來西亞	略降	6/16	28,651(49)	
越南	下降·處低水平	6/12	22,842(5)	

三、日本腦炎

- (一) 新增 7 例確定病例，個案居住地為台南市及高雄市各 2 例，新竹縣、南投縣及嘉義縣各 1 例。
- (二) 今年迄 7/2 累計 19 例，分別為高雄市 8 例、嘉義縣及台南市各 3 例，新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣及屏東縣各 1 例；為 2014 年以來同期次高；個案住家或工作地／活動地附近多有病媒蚊孳生高風險環境。
- (三) 我國每年 5 至 10 月為流行季節，其中又以 6 至 7 月為流行高峰；近年各縣市多曾出現散發病例，以 40 歲以上成人為多。2014 至 2017 年全國確定病例數分別為 18、30、23 及 25 例。

四、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

(一) 國際疫情

1. WHO 於 6/15 公布沙烏地阿拉伯今年 1/12-5/31 累計新增 75 例確診病例，其中 23 例死亡，並包含 4 件群聚事件。
2. 2018 年迄今曾公布病例國包括沙烏地阿拉伯、阿曼、阿拉伯聯合大公國及馬來西亞（為境外移入病例）。全球自 2012 年 9 月迄今累計 2,220 例，790 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，逾 80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。

(二) 國內疫情：自 2012 年起累計通報 20 例，均排除感染。

五、伊波拉病毒感染

- (一) 剛果民主共和國西北部赤道省 4/4-6/27 累計 55 例（38 例確診、15 例極可能及 2 例疑似；3 名醫護人員），包含 29 人死亡，病例分布於比科羅 (Bikoro)、伊波克 (Iboko) 及萬佳達 (Wangata) 等 3 個區域。該國當局表示已完成最後一名確診病例的所有接觸者 21 天監測期，若 42 天 (2 個潛伏期) 未再新增確診病例，將宣布疫情結束。

- (二) 剛果民主共和國自 5/21 開始接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)，共計 3,330 人接種。
- (三) WHO 於 6/20 公布剛果民主共和國自 6/2 起無新增確診病例，在疫情獲得全面控制之前，仍應著重於加強監測及主動篩檢。

六、立百病毒感染

- (一) 印度西南部喀拉拉邦截至 6/25 累計 22 例（18 例確診），包含 17 例死亡（16 人確診），其中 1 名為醫護人員，分布於馬拉普蘭縣(Malappuram)及科澤科德縣(Kozhikode)。自 6/3 起無新增確診病例，該國當局於 6/11 宣布目前已全面控制疫情，並持續維持警覺至 6/30。
- (二) WHO 於 5/24 表示基於印度具快速應變及檢驗能力，且目前疫情仍限於特定區域，評估該國國內及區域傳播風險為低。

七、國際間旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型 流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、 福建省、北京市	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/5/15
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/5/15
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、 越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、 印度、泰國、哈薩克、菲律賓； 非洲國家：剛果民主共和國、 獅子山、奈及利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼 亞、烏克蘭、希臘、英國、 塞爾維亞、法國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/3/13
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、 卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	亞洲 1 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、 非洲 2 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/3/13
	亞洲 11 國、美洲 21 國、非洲 10 國、大洋洲 2 國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/3/13

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	發布日期
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/2/13
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒 感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/5/15

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

發行人：周志浩

出版機關：衛生福利部疾病管制署

總編輯：林詠青

地址：臺北市中正區林森南路 6 號

執行編輯：陳學儒、李欣倫

電話：(02) 2395-9825

網址：<http://www.cdc.gov.tw/>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2018;34:[inclusive page numbers].[DOI]