

日期：2018 年第 33–34 週(2018/8/12–8/25) DOI：10.6524/EB.201809_34(17).0002

疫情概要：

我國近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 型為多；腸病毒門急診就診人次持續下降且低於流行閾值，惟即將開學，人群密切接觸可能致疫情上升。新北市新莊區瓊林里、台中市大里區東昇里開心農場及鄰近地區、嘉義縣溪口鄉出現登革熱本土群聚；中部以南大雨致部分地區淹水，全國疫情風險提升。日本腦炎疫情高峰已過，惟仍處流行期，可能出現零星病例。

香港出現本土登革熱疫情，個案均曾有黃大仙區獅子山公園及鄰近地區或長洲活動史。英國出現近 5 年首例 MERS 病例，為沙烏地阿拉伯境外移入；中國大陸新增 H5N6 流感病例，我國 8/21 提升廣西壯族自治區旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)；歐洲今年麻疹疫情明顯上升，基於當地感染風險增加，除原已列入我國麻疹旅遊疫情建議之 7 個歐洲國家外，8/28 另提升喬治亞及俄羅斯旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。

一、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 第 33–34 週全國健保腸病毒門急診就診人次持續下降，且低於流行閾值(11,000 人次)。
2. 新增 2 例腸病毒重症病例，分別為幼童感染克沙奇 A9 型及新生兒感染克沙奇 B5 型。今(2018)年累計 27 例，其中 11 例為新生兒（含 7 例死亡）；重症感染型別多樣，以伊科病毒 11 型 10 例及腸病毒 71 型 6 例為多，另有感染克沙奇 A4、A9、A16 及 B1、B2、B3、B5 型；去(2017)年累計 24 例（含 1 例死亡），以感染腸病毒 D68 型 12 例為多。
3. 近 4 週社區腸病毒型別以克沙奇 A 型為多，伊科病毒 11 型及腸病毒 71 型新增個案數呈下降趨勢，以輕症及散發病例為主；今年累計 64 例腸病毒 71 型個案，其中 6 例重症。



圖一、2017–2018 年腸病毒健保門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2018年		備註
			截止點	報告數(死亡數)	
馬來西亞		處高峰·高於流行閾值	8/18	53,156(2)	高於去年同期
新加坡		上升·高於流行閾值	7/28	26,252	高於去年同期
泰國		下降·處高峰	8/20	41,702(0)	低於去年同期
韓國		下降·處高峰	8/18	門診就診千分比:18.1	高於去年同期
澳門		下降·處高峰	7/14	1,926	高於2012-16年同期均值
中國大陸		下降	8/12	1,471,510(29)	高於近3年同期
越南		上升·低於流行閾值	8/11	28,417(0)	低於2013-17年同期均值
日本		下降	8/12	69,062	低於去年同期
香港		處基線水平	8/18	急診就診千分比:1.0	與去年同期相當


二、登革熱

(一) 國內疫情

1. 本土病例

- (1)今年迄 8/27 累計 47 例，個案居住地分別為新北市 21 例（均為新莊區）、台中市 20 例、台北市及嘉義縣各 2 例，桃園市及高雄市各 1 例；去年共 10 例。
- (2)本季共發生 3 起群聚，包括新北市新莊區瓊林里、台中市大里區東昇里開心農場／內新市場、嘉義縣溪口鄉。
- (3)新北市新莊區近二週新增病例均有瓊林里或菜園活動史，疫情熱區於瓊林里；惟病例數增幅平緩，顯示疫情已獲控制；台中市新增病例多有大里區開心農場／內新市場鄰近地區活動史，疫情處高發期；嘉義縣溪口鄉群聚累計 2 例，目前暫無新增病例。

2. 境外移入病例：今年迄 8/27 累計 161 例，90%以上病例感染地為東南亞國家。近一個月境外移入病例感染國家以泰國、柬埔寨及菲律賓等東南亞國家為多；去年共 333 例。



圖二、2017-2018 年登革熱病例通報趨勢

(二) 國際疫情


1. 東南亞及鄰近國家登革熱病例數統計

國家	趨勢	疫情趨勢	2018年		
			截止點	報告數(死亡數)	備註
馬來西亞		處高峰	8/18	46,544(76)	
泰國		下降·處高峰	8/20	47,149(58)	高於去年同期
寮國		下降·處高峰	8/4	3,428(13)	
越南		略升	8/4	39,692(9)	
中國大陸		略升·處低水平	7/31	451(0)	
柬埔寨		低於閾值	8/7	4,657	高於去年同期
斯里蘭卡		下降	8/24	36,007	
新加坡		持平·處低水平	8/18	1,731	

2. 香港：出現本土登革熱病例，8/14 至 8/25 累計 26 例，公布完成檢驗者皆為血清型第 I 型，17 名個案曾去過黃大仙區獅子山公園及其鄰近區域，另 9 名個案有長洲活動史。

三、日本腦炎

- (一) 疫情高峰已過，惟仍處流行季節，可能出現零星病例。新增 1 例確定病例，個案居住於雲林縣；今年迄 8/27 累計 35 例，中部以南個案佔 69%。個案居住地分布於 13 個縣市，以高雄市 8 例、桃園市 4 例，新北市、彰化縣、南投縣、嘉義縣及台南市各 3 例為多；個案住家／工作地／活動地附近多有病媒蚊孳生高風險環境。
- (二) 我國每年 5 至 10 月為流行季節，其中又以 6 至 7 月為流行高峰；近年各縣市多曾出現病例，以 40 歲以上成人為多。



圖三、2014-2018 年日本腦炎確定病例趨勢

四、人類新型 A 型流感—H5N6 流感

- (一) 中國大陸：新增 1 例，為廣西壯族自治區 42 歲男性，8/10 發病，8/15 住院治療，病情嚴重，發病前曾接觸家禽。本季累計 3 例，分布於廣西壯族自治區、福建省；自 2014 年迄今累計公布 20 例，13 例死亡。
- (二) 我國於 8/21 提升中國大陸廣西壯族自治區旅遊疫情建議至第二級警示 (Alert)。

五、伊波拉病毒感染

- (一) 剛果民主共和國北基伍省及伊圖里省伊波拉疫情於 5/11–8/26 累計 111 例 (83 例確診、28 例極可能；另有 10 例疑似病例待調查)，其中 75 人死亡；本次疫情共 14 名醫護人員感染，另病例年齡分布較為年輕，但仍處正常範圍內。自 8/8 起累計 4,130 人接種實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)。
- (二) 世界衛生組織(WHO)表示剛果民主共和國本次疫情相較先前赤道省疫情有多個差異性，包含人口密度及流動高、流離失所者眾多、位處武裝衝突地區，以及婦女及孩童感染者較多，可能因孩童多由婦女負責照顧或其他文化因素所致，需進一步調查；8/22 維持評估剛果民主共和國該國內及區域風險為高，全球為低。

六、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 (MERS-CoV)

(一) 國際疫情

1. 沙烏地阿拉伯：今年 7 月累計新增 6 例，其中 1 例死亡，個案相關資訊未公布。
2. 英國：中部利茲市新增 1 例，為該國近 5 年首例，個案來自沙烏地阿拉伯西部麥加省，未參加朝覲，8/13 於沙國時即出現症狀，8/16 搭乘沙烏地航空抵達，當局已展開相關防治措施，評估該國社區傳播風險低。
3. 全球：2012 年 9 月迄今累計 2,241 例，795 例死亡，27 國家／屬地出現疫情，逾 80% 個案集中於沙烏地阿拉伯。

- (二) 國內疫情：自 2012 年起累計通報 20 例，均排除感染。

七、歐洲麻疹疫情

- (一) 歐洲今年 1–6 月累計逾 41,000 例，已高於近 10 年任一年年總數，共 7 國(法國、喬治亞、希臘、義大利、俄羅斯、塞爾維亞及烏克蘭) 報告 1,000 例以上，其中以烏克蘭超過 23,000 例為最多，死亡數以塞爾維亞 14 人為最高。
- (二) WHO 表示雖然歐洲 2 劑麻疹疫苗接種率自 2016 年的 88% 增加至 2017 年的 90%，惟各地接種率落差仍大，持續呼籲各國應立即採取措施，以阻止疫情進一步擴散。
- (三) 基於當地感染風險增加，我國於 8/28 提升喬治亞、俄羅斯麻疹旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。

八、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	發布日期
新型 A 型 流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、福建省、北京市、 廣西壯族自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/8/21
		其他省市，不含港澳	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/8/21
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/8/16
麻疹	亞洲國家：中國大陸、印尼、印度、泰國、哈薩克、菲律賓； 非洲國家：剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、幾內亞； 歐洲國家：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、希臘、英國、塞爾維亞、法國、 俄羅斯、喬治亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/8/28
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒 感染	亞洲 2 國、美洲 21 國／屬地、大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/7/29
	亞洲 10 國、美洲 21 國、非洲 10 國、大洋洲 2 國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/7/29
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2018/2/13
黃熱病	巴西		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒 感染	剛果民主共和國		第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/5/15

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2018;34:[inclusive page numbers].[DOI]