

感染麻疹併發重症 高風險族群請注意

感染麻疹後在各年齡層都可能發生併發症，但5歲以下嬰幼兒、及20歲以上成年人風險較高。約5-10%的患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，如造成中耳炎、肺炎及腦炎等。

01 高風險族群有



✓ 免疫不全患者

例如愛滋病、白血病、淋巴瘤或其他癌症，以及正接受免疫抑制藥物治療的病患。這些病患感染麻疹後的表現可能不典型或不出疹。

✓ 孕婦

孕期內感染麻疹，除了會提高孕婦併發肺炎、腦炎等風險，也會造成流產、胎兒體重不足及死產等情況。

02 請你跟我這樣做

✓ 高風險族群，在麻疹流行期間應避免接觸確診或疑似麻疹的個案，及前往麻疹流行地區。

✓ 衛生單位列管追蹤的接觸者，必要時請配合依疾病管制署「疑似麻疹個案接觸者暴露後預防建議措施」注射射MMR疫苗、肌肉注射免疫球蛋白IMIG或靜脈注射免疫球蛋白IVIG等預防措施，以避免發病或降低疾病嚴重度。

✓ 衛生單位列管追蹤的接觸者，應配合衛生局每日實施健康監視，若出現疑似症狀需就醫時，請配合衛生局安排就醫。

✓ 進出公共場所人多擁擠處，注意呼吸道衛生及咳嗽禮節；如身體不適、前往醫院或診所就醫時，請全程配戴口罩！

