



## 腸病毒疫情週報


### 國內疫情

#### 疫情現況摘要：

目前腸病毒疫情已趨緩；第48週社區腸病毒陽性率較前一週下降，社區主要流行病毒株為克沙奇A型，本年檢出陽性型別前三位依序為CA6、CA10、CB4。腸病毒就診病例千分比自今年3月中旬開始上升，於6月中旬達高峰後疫情持續下降，9月中旬反轉上升，出現2波較小疫情。第50週急診腸病毒就診病例千分比(2.94)較前一週(3.06)下降；第50週無新增腸病毒重症確定病例，本年迄今共9例腸病毒重症確定病例，其中1例死亡，確定病例感染病毒型別分別為5例腸病毒71型、3例克沙奇A6、1例伊科病毒30型；將持續監測疫情及流行病毒株變化。

#### 一、社區病毒監測

2013年第48週社區腸病毒陽性率為42.3%(較前一週下降)，第48週腸病毒陽性檢體當中86.4%為CA、9.1%為NPEV、4.5%為EV71，於花蓮縣新增1件EV71陽性檢體。本年迄今檢出陽性型別前三位依序為CA6、CA10、CB4，目前共檢出17件EV71陽性檢體。



各型病毒詳細資料可參閱「病毒性感染症合約實驗室檢驗週報」，網址：


<http://www.cdc.gov.tw/professional/list.aspx?treeid=4C19A0252BBEF869&nowtreeid=250F4B6353598518>



## 二、急診監測

腸病毒就診病例千分比自今年3月中旬開始上升，3月底進入流行期，於6月中旬達高峰後疫情持續下降，9月中旬反轉上升，出現2波較小疫情。近四週台灣腸病毒急診就診病例千分比持續下降，分別為 4.71, 3.62, 3.06, 2.94，目前疫情已趨緩，將持續監測疫情及流行病毒株變化。

2007~2013年台灣腸病毒流行趨勢圖-以急診病例千分比分析



預警值、流行閾值之說明：


代表意義：就診病例千分比超過預警值代表疫情進入流行期；超過流行閾值代表進入流行高峰期。

計算方式：連續2週社區腸病毒陽性件數占全年腸病毒陽性總件數百分比小於 1.92%\*的週別定義為非腸病毒流行週；以近3年非腸病毒流行週之急診病例千分比求算平均值(mean)及標準差(SD)，預警值定義為 mean、流行閾值定義為 mean+1.64\*SD。

註\*：假設全年腸病毒陽性件數平均分布於 52 週，則每週陽性件數占全年陽性件數百分比之期望值為 1/52=1.92%

第50週腸病毒就診病例千分比以南區較前一週上升，北區與前一週持平，其餘各區均較前一週下降。目前以北區(3.23)、中區(3.41)、南區(3.28)、東區(3.26)高於全國平均值(2.94)。


腸病毒地區別急診就診病例千分比監測趨勢圖



### 三、重症監測

第50週無新增腸病毒重症確定病例，2013年迄今共通報122例疑似重症病例，其中9例確定(含1例伊科30型個案死亡)，感染病毒型別5例為腸病毒71型、3例為克沙奇A6、1例為伊科病毒30型；去年同期累計為153例確定病例(含2例死亡)。

2012-2013年台灣腸病毒重症疫情趨勢圖



每日最新趨勢圖及病例分布可參閱：


<http://nidss.cdc.gov.tw/SingleDisease.aspx?dc=1&dt=3&disease=0749>

2013年截至第50週累計共9例腸病毒重症確定病例；2008-2012年同期(發病週第1-50週)累計分別為369、29、16、53、153例；今年腸病毒重症確定個案年齡性別及居住地分布如下。

2013 年台灣腸病毒重症  
確定病例年齡性別分布

年齡(歲)	男性	女性	總計
<1	2	0	2
1	2	1	3
2	1	1	2
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	0	1
6	0	0	0
7-9	0	0	0
≥10	1	0	1
總計	7	2	9

2013 年台灣腸病毒重症  
確定病例地理分布



## 四、停課監視

第50週以北區、中區幼兒園停課班級數較前一週略增，其餘均較前一週減少。

第50週各區停課班級數				2013年截至目前各區停課班級累計數					
區別	幼兒園	國小	其他	小計	區別	幼兒園	國小	其他	小計
台北區	7	1	1	9	台北區	940	183	430	1553
北區	12	3	0	15	北區	740	243	52	1035
中區	6	0	1	7	中區	682	186	28	896
南區	4	0	0	4	南區	756	136	28	920
高屏區	2	1	0	3	高屏區	606	232	40	878
東區	0	0	0	0	東區	98	15	4	117
小計	31	5	2	38	小計	3822	995	582	5399

註：本局已訂定「腸病毒停課建議標準」，提供各縣市自行制定停課復課決策機制之參考，由各縣市視轄區腸病毒流行情形及疫情幅度，決定是否須採取停課措施。

其他係指除國小及幼兒園之外之所有機構(托兒所、托嬰中心、國中、補習班、療育機構等)

停課資料更新自12/17教保育機構停課通報監測系統。

台北區縣市為基隆市、宜蘭縣、台北市、新北市、金門縣、連江縣

北區縣市為桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣


中區縣市為台中市、彰化縣、南投縣

南區縣市為雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

高屏區縣市為高雄市、屏東縣、澎湖縣

東區縣市為花蓮縣、台東縣

## 2013年腸病毒各型學校機構停課趨勢



## 國際疫情

1. 日本：今年手足口病定醫平均報告數於第30週達高峰後持續下降；累計分析共1,589例手足口病患者病毒型別，以CA6型為主。
2. 新加坡：今年第49週通報628例手足口病，高於前5年同期平均，已低於預警值，每週通報數緩慢下降。

