

馬堡病毒出血熱

(Marburg Hemorrhagic Fever)

一、臨床條件

具有下列任一個條件：

- (一) 急性發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- (二) 頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、吞嚥困難、丘疹、紫斑、中樞神經系統症狀等任一臨床描述。
- (三) 不明原因出血。
- (四) 突發性不明原因死亡。

二、檢驗條件

具有下列任一個條件：

- (一) 臨床檢體（咽喉擦拭液或有病灶之皮膚切片等）分離並鑑定出馬堡病毒（Marburg virus）。
- (二) 臨床檢體分子生物學核酸檢測陽性。
- (三) 血清學抗體 IgG 及(或)IgM 檢測陽性。
- (四) 組織切片免疫化學染色（IHC）陽性。

三、流行病學條件

發病前 3 週內，具有下列任一個條件：

- (一) 具有馬堡病毒出血熱流行地區之旅遊史或居住史。
- (二) 接觸極可能病例或確定病例之血液或體液或其污染物。
- (三) 具有馬堡病毒出血熱流行地區蝙蝠或靈長類等之接觸史。
- (四) 進行馬堡病毒或檢體之實驗室操作。

四、通報定義

具有下列任一個條件：

- (一) 符合臨床條件以及流行病學條件。
- (二) 符合檢驗條件。

五、疾病分類

(一) 極可能病例：

雖未經實驗室證實，但符合臨床條件，且於發病前 3 週內接觸確定病例之血液或體液者。

(二) 確定病例：

符合檢驗條件。

六、檢體採檢送驗事項

傳染病名稱	採檢項目	採檢目的	採檢時間	採檢量及規定	送驗方式	應保存種類 (應保存時間)	注意事項
馬堡病毒 出血熱	血清	病原體 檢測	發病 7 日內	以無菌塑膠試管收集靜脈血 5-10 mL。	2-8°C (A 類感染性物質 P620 包裝)	病毒株(30 日); 血清(30 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢體勿加入任何添加物。 2. 血清檢體以無菌真空塑膠試管(紅頭管)採靜脈血 5-10 mL, 貼上個案資料標籤送驗。 3. 若所採之急性期血清為發病 3 日內, 檢驗結果為陰性, 應再次採檢送驗, 以排除感染。 4. *咽喉擦拭液及皮膚切片視情況採檢送驗。
	血清(30 日)						
	病毒株(30 日); 咽喉擦拭液(30 日)						
皮膚切片*	皮膚出血或病變處。	病毒株(30 日); 皮膚切片(30 日)					