

應當做到的事

- 使用前請詳細閱讀使用說明書，並遵照其內容指示操作。
- 噴劑型蚊蟲忌避劑應於空氣流通之開放空間使用，避免吸入人體。
- 蚊蟲忌避劑使用量應足夠覆蓋於裸露皮膚及衣物上，過量使用並無法提供更有效的保護效果。
- 外出返家時應使用肥皂清潔皮膚殘留之蚊蟲忌避劑並換洗衣物。

避免的事

- 噴劑型蚊蟲忌避劑不可直接朝臉部噴灑，應取適當的份量於手上再塗抹臉部。
- 衛生福利部核可之蚊蟲忌避劑可噴灑或塗抹於裸露皮膚及衣物上，但應避免接觸眼睛、嘴巴、傷口及發炎或濕疹之皮膚。若擔心過敏發生，可先使用於小面積的皮膚上，若無問題再使用於其他地方。



蚊子、恙蟲、蜱蟲、蚤類等蚊蟲身上會攜帶危險的致病原，被叮咬後可能使人類生病，如登革熱、屈公病、瘧疾、日本腦炎、西尼羅熱、恙蟲病、萊姆病及鼠疫等。保護自己免於被蚊蟲叮咬的方法之一為安全並正確地使用蚊蟲忌避劑（防蚊藥劑）。

關於DEET

N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
待乙妥、敵避

化學成分DEET為現今最有效且最被廣泛用於蚊蟲忌避劑的成份，市售產品中，DEET的濃度範圍從10%以下到30%以上都有，一般來說，較高濃度的DEET能提供較持久的防蚊蟲保護效果，可依照個人的需求選擇。美國兒科醫學會（American Academy of Pediatrics）建議年齡2個月以上之孩童可選用含30% DEET濃度以下的產品，年齡2個月以下之嬰兒則不建議使用。

蚊蟲忌避劑

（防蚊藥劑）

你擦對了嗎？



www.cdc.gov.tw
105.06



1922防疫達人 
www.facebook.com/TWCDC

廣告



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

疫情通報及諮詢專線：1922

一、目前我國含有DEET成分之蚊蟲忌避劑（防蚊藥劑）分為下列兩種：

1. 衛生福利部管理：

中文名稱為「待乙妥」

標示字號為「衛署藥製」

使用於皮膚上，核准之適應症為「驅除蚊、蒼蠅、蚤、蝨、水蛭等害蟲叮咬」，屬於藥局才可販售之指示用藥。



2. 環保署管理：

中文名稱為「敵避」

標示字號為「環署衛製」或「環署衛輸」

只能用於環境上，屬於一般環境用藥。



二、依據衛生福利部92年2月18日衛署藥字第0920313818號公告：「使用於人體皮膚上之『精油類防蚊液』製品暫不列入藥品管理」。故使用於人體之蚊蟲忌避劑（防蚊藥劑），應選擇通過藥品查驗登記，經衛生福利部核准之產品，以有效避免病媒蟲叮咬。

三、有關衛生福利部核可之蚊蟲忌避劑（防蚊藥劑）品項，可至衛生福利部食品藥物管理署網站「西藥、醫療器材、化妝品許可證查詢作業」查詢。

蚊蟲忌避劑（防蚊藥劑）種類

- 市售的蚊蟲忌避劑劑型相當多，有噴劑型，也有塗抹用的乳膏狀劑型。有些製造原料為化學成分，有些為天然成分。衛生福利部核可的防蚊藥劑可使用於皮膚上或是衣物上，而環保署核可的藥劑則使用於環境中。
- 以樟腦油、香茅油、香茅等天然或植物提煉成分製成的蚊蟲忌避劑，因其防蚊蟲的時效短，從幾分鐘到二小時都有，故含化學成分DEET之蚊蟲忌避劑為現今最有效且最被廣泛使用的蚊蟲忌避劑。



對於防範蟬蟲的叮咬，建議使用含20%至50% DEET濃度之蚊蟲忌避劑保護效果較佳。若長期待在戶外，補充使用藥劑的時間須依照產品標示的說明，以確保藥效。



備註：若外出地區同時具有被蚊子和蟬蟲叮咬的風險，建議使用含20% - 50% DEET濃度之蚊蟲忌避劑的保護效果較為完善。

